



Informace k užívání přípravků na parazity a jejich dávkování

- tento text není v žádném případě náhradou oficiálně povolené lékařské péče, lékařských předpisů a je jen souhrnem dostupných informací a případných zkušeností s klienty a je na zodpovědnosti každého uživatele, s kým a jakými lékaři konzultuje svůj zdravotní stav a následnou medikaci !

Neprodáváme žádné léky ani antihelmintika!

Nepoužíváme ve svých postupech antihelmintická farmaka !

- dle dosavadních zkušeností našich klientů lze všechny antiparazitální léky a přípravky zcela nahradit sofistikovaným komplexním přístupem s použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, zcela nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na všechna vývojová stadia a formy většiny patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší efektivitu a funkčnost, než z původních seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), a tak i zrychlení celého procesu detoxikace, bez zbytečných zátěží orgánů a detoxikačních příznaků !

-

Upozornění - varování

Jakékoliv nesystemické a neřízené použití chemických přípravků, bylinných přípravků, informatik i frekvenčních terapií může mít nepříjemné dopady a zcela zbytečné komplikace !!!

.

K potlačování řešení zdrojové příčiny dochází nejen v oficiální alopatické medicíně, ale stejně tak v alternativních směrech. Není velký rozdíl jestli dojde k potlačení projevu schváleným chemickým lékem či bylinou, frekvencí, masáží, homeopatikem, energetickým působením či nějakou mentální psycho-technikou.

.

Použití antihelmintik a další chemie je vhodné jen v případě potřeby akutního zásahu a pod odborným vedením, stejně ale bez smysluplného zapojení bylinných preparátů a plasmového generátoru (s kompletními sadami frekvencí na všechna stadia a formy parazitů) a práce s psychosomatikou je toto z pohledu systemického přístupu a komplexních výsledku u klienta naprosto nedostatečné a vede to dle tohoto chápání (i přes případnou úlevu) většinou k rozsevu do jiných částí těla, potlačení zátěže do periferií a hlubších částí těla !!! a často tak dochází ke zbytečnému prodlužování čistícího procesu či odkládání řešení problému v čase.

.

- následující text je jen přehledem a souhrnem nejobvyklejších užívacích protokolů (vyzkoušených osobně stejně jako mnohými klienty) v rámci antiparazitálních kúr, uváděných v běžně dostupných textech na internetu, a je plnou

zodpovědností každého, jaký postup zvolí či s jakým odborným lékařem bude případné užití konzultovat

-

Praziquantel:

1. Základní vzestupné dávkování - optimální pro běžné i silnější zamoření a první základní kúry !!! (nejúspěšnější a nejoblíbenější užívací protokol našich klientů)

- začít níže uvedeným nižším dávkováním a pokud příznaky nejsou příliš nepříjemné, tak zvednout dávku, pokud horší příznaky, tak držet ještě chvíli nižší dávkování, po lehké snídani či jídle a zapít vždy čerstvou grepovou šťávou (plus info viz níže)!

- pro 1. den tedy je jedna dávka praziquantelu $D = \text{min. } 15\text{mg/kg váhy}$, tedy **900mg/60kg**, resp.

1200mg/80kg

atd. Toto nižší dávkování 1. den je vhodné pro slabší detoxikační reakci uživatele a snížení objemu patogenů a získání důvěry u klienta.

- **1.den: D-0-D**

- **dále pak už ale jedna dávka praziquantelu $D = 25 \text{ mg/kg váhy !}$, tedy **1500mg/60kg** (2,5 tbl), resp.**

2000mg/80kg

(3,3tbl),

2100mg/84kg

(3,5tbl)

1800mg/73kg

(3tbl),

2400mg/96kg

(4tbl.) atd.

- **Pozn.:** Z dostupných zahraničních informací i zkušeností našich klientů **je jakékoliv nižší dávkování než 25 mg/kg váhy** pro převažující část kůry (potřebné, aby se účinná látka dostala skutečně do celého těla) **ve většině případů, naprosto nedostatečné a vede jen k prodlužování léčby, potřebě zbytečného opakování celých kúr a k případnému poschovávání parazitů na periferiích "na pozdější lepší časy"!!**

- **2.den: D-0-D nebo D-D-D (podle snášení a případných reakcí)**
- **3.den: D-0-D nebo D-D-D**

- **pauza 4-7 dnů** - ale po tuto dobu je potřeba držet střevo **ořešákem** nebo **hřebíčkem** a rovněž dle možných příznaků může být vhodné zařadit 1-3 vložené dávky v průběhu týdne. Pokud týdenní pauzu nastavíme na celých 7 dní tak 1den s dávkami uprostřed týdne je velmi vhodný, pokud jen 4 dny (začátek cyklu vždy např. v pátek), tak se lze obejít i bez těchto vložených dávek.

Nejčastěji je používána pauza 4 denní

, která využije víkendový způsob cyklů.

- **pak dále : Praziquantel D = 25 mg/kg váhy !**
- **1.den: D-0-D**
- **2.den: D-0-D nebo D-D-D** (pokud průběh předchozích dávek probíhá v klidu)
- **3.den: D-0-D nebo D-D-D**

- **pauza 4-7 dnů** - ale po tuto dobu je potřeba držet střevo **ořešákem** nebo **hřebíčkem** a rovněž dle možných příznaků může být vhodné zařadit 1-3 vložené dávky v průběhu týdne

- - a pak stále dále **praziquantel D = 25mg/kg váhy**
- **1.-3. den: D-0-D nebo D-D-D** (pokud nevyšlo zařadit polední dávku v minulých cyklech, celkem je vhodné min. 3-6 x polední dávku zařadit)

- **pauza 4-7 dnů** - optimální 4-5 dnů, a po tuto dobu je potřeba držet střevo **ořešákem** nebo **hřebíčkem**

a rovněž dle možných příznaků může být vhodné (u delší pauzy 5-7 dnů) zařadit 1-3 dávky praziquantelu v průběhu týdne

- - a pak **praziquantel D = 25-15 mg/kg váhy (dle průběhu)**
- **1.-3. den : D-0-D nebo D-D-D**

- - celkem tedy cca 4 tří-denní cykly, 2-3x denně během cca 1 měsíce s pauzami 4-7 dnů mezi cykly
- - dle potřeby zopakovat celou kúru a pokud přetrvávají příznaky nebo se postupně otevírají cysty a skrytá ložiska, tak dlouhodoběji **1-2x denně po další dny** (většinou **2-3 dávky po sobě**, **25-15 mg/kg) v cca týdenních intervalech**
- viz. dále: dočišťovací protokol.

Pro zesílení účinku je možné použít též směsný protokol s albendazolem (příp. niclosamidem) a velmi vhodná je kombinace s aloe vera gelem nebo mms

(pozn. tzv. 100%koncentrované šťávy se = cca 25-50% gelu, například od LR)

2. zesílené dávkování (curezone protocol) - vhodné pro silné zamoření, akutní projev, časový tlak (a drsnější povahu uživatele)

- jedna dávka **D = 25mg/kg váhy**, tedy **1500mg/60kg (2,5tbl)**, resp. **2000mg/80kg (3,3tbl)**, **2100mg/84kg (3,5tbl)**
- **1800mg/73kg (3tbl)**,
- **2400mg/96kg (4tbl.) atd.**

- 3dny - 3x denně dávka a dávky po týdnu 3 dny opět,
- **1.den: D-D-D**

- **2.den: D-D-D**
- **3.den: D-D-D**
- týden pauza - pak opět :
- **1.-3. den: D-D-D**
- **týden pauza a případně zopakovat celý cyklus 14 dnů znovu ! - celkem tedy pak kúra na 5 týdnů**
-
- **celkem tedy 18-36xD**
- - doporučuje se preventivní užití **kúry 2-4x ročně**, dle předpokládané zátěže)
- - vždy před nebo po lehkém jídle a **zapít čerstvou grepovou šťávou**, po užití může být závrať do 1-3hod po 1.užití (zaplavený mozek), pokud není ani trochu při zjevné zátěži, tak je možno dávku navýšit, závratě další den odezní
- před užitím vhodná kontrola očí na Taenii solium a příp. jiné zátěže a zapperovat na víčka – vyhnat z očí, případně kapat koloidní stříbro
-
- možné dávkování **střídavě s albendazolem – viz níže**

3. Zeslabené dávkování: (vhodné ale jen pro některá lehčí zamoření nebo opakované preventivní kúry či mimořádné speciální dávky). Pro většinu středně a silně zamořených klientů je na první kúru nedostačující dávkování a je třeba kúru vícekrát celou opakovat, a to ať už se použije generikum nebo originální Cesol, jinak pak často zůstanou paraziti poschovávaní na perifériích. Pro zmíněná rizika tuto kúru o slabším dávkování standardně nedoporučujeme !

- jedna dávka D = min. **15mg/kg váhy**, tedy **900mg/60kg**, resp. **1200mg/80kg** atd.
 - 1.den: D-0-D
 - 2.den: D-0-D
 - 3.den: D-0-D
 - po 1.týdnu 1 den nebo 3 dny: D-0-D
 - po 2.týdnu 1 den nebo 3 dny: D-0-D
 - po 3.týdnu 1 den nebo 3 dny: D-0-D
 - **Pokud se neprojeví po užití určité příznaky (lehké zamotání hlavy, výraznější čištění střeva atd.) je potřeba dávkování navýšit**
- !!! Dle potřeby opakovat celou kúru vícekrát.**

4. dočišťovací protokol - vhodné a potřebné pro dočišťování v případě většího zamoření cystami echinokoka a jiných tasemnic (nebo v případě čerstvých infekcí)

- - po absolvování základní kúry s praziquantelem
- - **1-3 dávky (25-15mg/kg)** během 1-2 dnů v cca **intervalech 7-14 dnů** v průběhu několika měsíců (u silného zamoření cystami echinokoka cca po dobu 1 roku i déle)
- - rozpouštění cyst je vhodné podpořit střídavě MMS nebo Aloe Vera gelem, plasmovým generátorem atd.

- - v měřícím okruhu pak v rámci diagnostiky EAV-Salvia jde dobře nastavovat dávkování zcela individuálně!! a případně ho i průběžně, podle idividuálních reakcí a procesů individuálně upravovat !! (toto platí pro každý druh léků a přípravků) . **Dávkování pod 25 mg/kg je ovšem možné použít až po absolvování 3 cyklů s tímto dávkováním (bez ohledů na reakci v měřícím okruhu) nebo při potřebě postupného navyšování v případě zdravotních problémů či horší herx.reakce Dávkování si lze ale pak také individuálně přibližně aktuálně upravovat jednoduchým pákovým kineziologickým testem na mincíři na cca 23 kg (pro štiky).**

- v případě aplikace i jiných postupů (např. plasmagenerátor, zábaly v modré skalici na svalovce v podkoží, kapsaicinové masáže, zapper, MMS, VMS atd.) během chemické kúry antihelmintiky, se může stát, že se uvolní do těla zacystovaná stadia parazitů (echinokok, tasemnice, trichenella,...), a může být pak vhodné aplikovat speciální dávku(y) praziquantelu i mimo týdenní interval. Každopádně je vhodné a potřebné během této kúry zajišťovat střevo i během týdenní pauzy např. ořesákem nebo hřebíčkem (u směsného curezone protokolu může být zajištěno dávkou albendazolu). Při použití grepové šťávy (zesilující účinek i jiných léků) je třeba v případě jiné medikace, probrat možnou interakci a dávkování s jejich předepisujícím lékařem. Pravidelné a opakované užívání MMS ve více dávkách po sobě je možné v pauzách mezi cykly s praziquantelem, nebo před kúrou, ale není vhodné souběžně v 3 denních cyklech. Pozor na používání MMS, které v případě brzkého či delšího užívání může nepříjemně zkomplikovat celý proces detoxikace, zhoršit příznaky a prodloužit celý proces nebo i potlačit některé

zátěže mnohem hlouběji do organismu. MMS je vhodný doplněk domácí lékárničky a může v určité fázi detoxu být dobrým pomocníkem, ale šablonovité a nevhodné užití může i napáchat více škody, než užitku !

Albendazol :

Albendazol je třeba žvýkat, cucat rozkousat v puse, jinak jen projde střevem !

- **K▫ albendazolu je třeba sníst cca 40g tuku (tučné maso, sýr, smetana, slanina...)! a vypít 2,5dcl vody.**

1.Základní dávkování:

- **Jedna dávka D = 400mg**
- 7 dní : D-0-D (dospělí) 1/2D-0-1/2D (děti)
- 7 dnů pauza
- 7 dní : D-0-D (dospělí) 1/2D-0-1/2D (děti)
- 7 dnů pauza
- 1-3 dny : D-0-D (dospělí) 1/2D-0-1/2D (děti)

2. Zesílené dávkování (Curezone protocol) – oblí hlísti - roupi,škrkavky, filárie, svalovci, ancylostoma, trichuris, strongyloides

- **Jedna dávka D = 400mg**
 - D - 2x denně po 14 dnů
 - 7 dnů pauza
 - opakovat D - 2x denně 7-14 dnů a případně dle potřeby znovu opakovat
-
- **Albendazol je třeba žvýkat, cucat rozkousat v puse, jinak jen projde střevem !**
 - **K albendazolu je třeba sníst cca 40g tuku (tučné maso, s ýr, smetana, slanina, olivový olej...)! a vypít 2,5dcl vody**

Spojené dávkování Praziquantel a Albendazol

- dle našich zkušeností lze všechny antiparazitální léky a přípravky zcela nahradit sofistikovaným použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, zcela nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na všechna vývojová stadia a formy většiny patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší efektivitu a funkčnost, než z původních seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), a tak i zrychlení celého procesu detoxikace, bez zbytečných zátěží orgánů a detoxikačních příznaků !

– zesílený účinek vzájemně a doplněný vzájemně ... je tedy vhodnější než samostatně jen albendazol ...

- působí více na cysty a vývojová stadia

- **platí stejná pravidla jako jednotlivých látek - viz výše samostatně (grepová šťáva a tuk)**
!!

2. Vzestupné směsné dávkování – Praziquantel a Albendazol - (nejúspěšnější a nejoblíbenější užívací protokol našich klientů)

- dle našich zkušeností lze všechny antiparazitální léky a přípravky zcela nahradit sofistikovaným použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, zcela nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na všechna vývojová stadia a formy většiny patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší efektivitu a funkčnost, než z původních seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), a tak i zrychlení celého procesu detoxikace, bez zbytečných zátěží orgánů a detoxikačních příznaků !

začít nižším dávkováním a pokud příznaky nejsou moc nepříjemné, tak zvednout dávku a přidávat albendazol, pokud horší příznaky, tak držet nižší dávkování. Platí stejné principy uvedené samostatně výše pro užití praziquantelu (grepová šťáva) a albendazolu (tuk).

- Pro 1. den je jedna snížená dávka **praziquantelu Ds = 15mg/kg váhy**, tedy **900mg/60kg**, resp. **1200mg/80kg**
atd. a dávka **albendazolu D alb=400mg**.
Další dny
pak už jedna základní dávka **praziquantelu D**

=

25mg/kg

váhy

, tedy

1500mg/60kg

(2,5tbl), resp.

2000mg/80kg

(3,3tbl),

2100mg/84kg

(3,5tbl)

,

1800mg/73kg

(3tbl),

2400mg/96kg

(4tbl.) atd.

- **1.den: Ds-0-Ds + D alb** – 1x denně s praziquantelem
- **2.den: D-0-D + D alb** – 1x denně s praziquantelem
- **3.den: D-(D)-D + D alb** – 2x denně s praziquantelem (ten 2-3x denně podle reakce)
- 4.-7. den : D alb 2 x denně (D-0-D)
- **8.-10.den: D-(D)-D + D alb** – 2 x denně s praziquantelem (tedy 2-3x denně praziquantel a 2x denně albendazol)
- 4-7 dnů pauza (s ořechákem nebo hřebíčkem mletým)
- **3 dny: D-(D)-D + D alb** – 2x denně s praziquantelem, ráno a večer (cca po 12 hod)
- 4 dny: D alb 2 x denně (D-0-D)
- **3 dny: D-(D)-D + D alb** – 2x denně s praziquantelem, ráno a večer (cca po 12 hod)
- 4-7 dnů pauza (s ořechákem či hřebíčkem)
- **3 dny: D-0-D + D alb** – 1x denně s praziquantelem
- **4 dny pauza** (s ořechákem či hřebíčkem)
- **1-3 dny: D-0-(D) + D alb** – 1x denně s praziquantelem (ten 1-2x denně)

Případně **opakovat po týdnu další třídenní cyklus** pzq s 1-2 dávkama albendazolu. Viz též dočišťovací protokol.

-

Ivermectin (Stromectol, Vermectin, Ivermite ...):

(vlasovci – filárie – larvy-mikrofilarie)

- dle našich zkušeností

1 dávka D= 0,20 mg x tělesná váha v kg (tedy např.: 12mg/60kg tj.2tbl.6mg, 15mg/75kg, 16mg/80kg, tj.cca 2,5tbl.6mg)

Dávka se užívá hodinu před spaním na prázdný žaludek a zapíjí 2,5 dcl vody.

.... Zařazením užití plasmového generátoru jde snížit počet cyklů (týdnů) nebo až úplně nahradit. Snížit množství dávek také může podpurná kúra mms, ale vzhledem k riziku rozprostření jiných parazitů v těle a možných herxhaimerových reakcí, je třeba postupovat řízeně a opatrně!

var.1: (průběžně rozptýlené dávkování)

- 2 x týdně Dpo 5-8 týdnů (= 10D-16D, pokračovat až do vymizení)

.

var.2: (týdenní cykly)

- **4 dny 1x denně D**

- **3 dny pauza**

- opakovat po celkem 3-6 týdnů (= **12D – 24D**, pokračovat až do vymizení)

.

var.3: (pulsní varianta)

- 7 dnů 1x denně D

- 4 dny pauza

- 2 dny 1x denně D

- 2 dny pauza

- 2 dny 1x denně D

- 2 dny pauza

- 2 dny 1x denně D

- 2 dny pauza

- 2 den 1x denně D

- Dvoudenní pulsy opakovat 2-4 týdny, celkem kúra 3-5 týdnů (=**14D-21D**, až do vymizení)

var.4: (kombinovaná týdenní a pulsní varianta)

- 4 dny 1x denně D

- 3 dny pauza

- 2 dny 1x denně D

- 2 dny pauza

- 2 dny 1x denně D

- 2 dny pauza

- 2 dny 1x denně D

- 2 dny pauza

- 2 dny 1x denně D

- atd.

- Dvoudenní pulsy opakovat po 2-4 týdny, celkem kúra 3-5 týdnů (min. **11D-18D**, pokračovat až do vymizení)

var.5: (post-treatment protocol, doléčovací protokol – cysty a prevence)

(pro cca 60kg D=12mg/kg, tj. 2 tbl.6mg, tj. celkem 8-16 tbl.6mg, pro cca 75kg D=15mg/kg, tj. 2,5 tbl.6 mg, tj. 10-20 tbl.6mg)

Hetrazan 100 mg (diethylcarbamazin)

(vlasovci-filárie – dospělci, cysty)

1 dávka D=1-3 mg / kg tělesné váhy denně (cca 2mg/kg váhy denně)

.... Zařazením užití plasmového generátoru jde snížit počet cyklů (dnů, týdnů) nebo jej zcela nahradit. Snížit množství dávek také může podpůrná kúra mms, ale vzhledem k riziku rozprostření jiných parazitů, je třeba postupovat řízeně a opatrně.

var.1: (vzestupné cykly s průměrnou dávkou D=2mg)

Směsný komplexní protokol na : tasemnice komplexně, vlasovce, motolice, škrkavky, svalovce, roupy, – niclosamid, albendazol, praziquantel, ivermectin a hetrazan - vhodný pro silná zamoření a časový tlak

(tento komplexní protokol byl vytvořen některými klienty a je příležitostně testován)

**D iver. = 0,2mg/kg váhy, D hetr. = 2-3 mg/kg váhy, D alb. = 400 mg (dospělý cca 60-80kg),
D pzq. = 25 mg/kg váhy, Niclosamid D nicl. = 2g / den**

3 dny - niclosamid (1.den D nicl. = 2g najednou, 2.-3.den D nicl. = 1g 2x denně)

3 dny - Dpzq+Dalb. - 0 - Dpzq+Dalb. (t.j. 2x denně)

3 dny - pauza

3 dny Diver. - 1x denně

2 dny Dhetr. - 1x denně 2 mg/kg

1 den D iver. - 1x denně

1 den pauza

2 dny - D hetr. - 2x denně 2 mg/kg

2 dny - D alb. - 2x denně 400mg

2 dny - D hetr. - 3x denně 2 mg/kg

1 den - D iver. - 1x denně

1 den pauza

3 dny - Dpzq+Dalb. - 0 - Dpzq+Dalb. (tj. 2x denně)

2 dny pauza

2 dny - D iver. - 1x denně

1 den pauza

2 dny - Dpzq -3x denně

2 dny pauza

2 dny - Diver. - 1x denně

1 den pauza

2 dny - Dpzq+Dalb. - Dpzq - Dpzq+Dalb. - (tj. Dpzq -3x denně plus Dalb.-2x denně)

2 dny pauza

1 den - Diver. 1x denně

1 den pauza

1 den - D pzq. - 2 denně

celkem tedy 46 dnů (cca 1,5 měsíce)

Vermox

☐ dle našich zkušeností lze všechny antiparazitální léky a přípravky zcela nahradit sofistikovaným použitím specifických sad frekvencí na plasmagenerátoru !

Máme speciální sady vlastních, zcela nových, vysoce účinných shift-frekvencí, na všechna vývojová stadia a formy většiny patogenů, vykazující nesrovnatelně vyšší

efektivitu a funkčnost, než z původních seznamů frekvencí (Dr.Clark či zejména CAFL či NCFL), a tak i zrychlení celého procesu detoxikace, bez zbytečných zátěží orgánů a detoxikačních příznaků !

- Rozprostřít na 5-6 týdnů, ničí jen dospělé ve střevu, nevstřebává se do krve a nepůsobí jinde
- 3 dny 1-0-1 za sebou pak týden pauza a zopakovat 3 dny pak 14 dnů pauza a opět zopakovat 3 dny a ještě jednou po dalších 14 dnech
- Přeléčit všechny spolubydlící, **Ize vkládat na noc tabletu do konečníku**
- Celkem 24 tbl /dospělou osobu

Fluconazolum

– 200-400mg/1x denně po 2-8 týdnů

či: Dospělí a děti nad 12 let: počáteční dávka - 15 mg/kg těl. hmot. v infúzi trvající min. 60 min

udržovací dávka - 7,5 mg/kg těl. hmot.

- více viz příbalový leták nebo stanovení lékařem

Doxycyclin 100 mg

anaplasma - 2x denně 10-14 dní (případně nahradit **erytromycinem** 500-1000mg 4x denně)

bartonella - 2x denně po 4 týdny nebo až 2-3 měsíce u HIV, endokarditidy, perzist. horečky...

.

.